

Kontakt

Klinik für Kieferorthopädie

Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. dent. Michael Wolf, M.Sc.

Uniklinik RWTH Aachen

Pauwelsstraße 30

52074 Aachen

Sekretariat

Tel.: 0241 80-88271

kieferorthopaedie@ukaachen.de

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin:

Tel.: 0241 80-88271 (Privatsprechstunde, 5. Etage)

Tel.: 0241 80-88272 (allgemeine Sprechstunde, 3. Etage)

Einen Erstberatungstermin können Sie auch online

vereinbaren: www.kieferorthopaedie.ukaachen.de

So erreichen Sie unsere Rezeption:

Sie treten durch den Haupteingang ein und gehen hinter der Rolltreppe links. Folgen Sie dem Gang B, bis Sie den Aufzug B2 erreichen. Mit diesem Aufzug fahren Sie auf die 3. Etage.

Auf die 5. Etage gelangen Sie am besten über den Aufzug B1. Dort finden Sie uns auf dem Flur 21.

Anfahrt

Für die Anreise mit dem Auto erfolgt die Anfahrt über die Kullenhofstraße. Mit dem Bus erreichen Sie uns mit den Linien E, 3A, 3B, 4, 5, 32, 33, 45, 70, 73 und 80 der ASEAG.



www.kieferorthopaedie.ukaachen.de

**UNIKLINIK
RWTHAACHEN**

Klinik für Kieferorthopädie



Informationen zur herausnehmbaren Zahnspange





Herausnehmbare Geräte können für jeden Kiefer einzeln, aber auch als zusammenhängendes Gerät für Ober- und Unterkiefer gleichzeitig hergestellt werden. Mit herausnehmbaren Zahnspangen kann man über Federn Zähne kippend bewegen. Eingearbeitete Schrauben können den Kiefer in Grenzen nachentwickeln.

Bei heranwachsenden Patienten wie auch zur Therapie von Funktionsabweichungen kann mithilfe von funktionskieferorthopädischen Geräten eine Korrektur der Lage von Ober- und Unterkiefer zueinander erfolgen bzw. Asymmetrien der Kiefer vorgebeugt werden.

Sie werden individuell für jeden Patienten geplant und im klinikeigenen Labor unter Verwendung hochmoderner digitaler Verfahren hergestellt. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben.



Informationen zur Nutzung und Pflege

-  Trage die Zahnspange mindestens 16-18 Stunden am Tag, denn nur wenn sie im Mund ist, funktioniert die Regulierung von Zähnen und Kiefer.
-  Bitte die Zahnspange beim Essen und Zähneputzen herausnehmen.
-  Bei dem Einsetzen der herausnehmbaren Zahnspange muss darauf geachtet werden, dass der vordere Drahtbogen vor den Frontzähnen liegt. Die Platte wird dann passend eingesetzt und an den hinteren Drahtelementen festgedrückt.
-  Bei dem Herausnehmen der Zahnspange immer an den hinteren Drahtelementen anfassen. Der vordere Drahtbogen ist flexibel und verbiegt sich leicht.
-  Die Zahnspange nach dem Herausnehmen aus dem Mund immer unter fließendem Wasser abspülen. Morgen und abends die Zahnspange mit Zahnbürste und Zahnpasta reinigen.
-  Wenn die Zahnspange nicht in deinem Mund ist, sollte sie immer in der Spangendose aufbewahrt werden.
-  Wenn deine Zahnspange eine Schraube hat, drehe diese so oft, wie wir es erklärt haben. Sie dient dazu, die Zähne und den Kiefer in eine bestimmte Richtung wachsen zu lassen. Es ist ganz normal, dass die Zahnspange im ersten Moment nach dem Drehen etwas enger ist, aber wenn die Zahnspange gut getragen wird, passt sie nach ein paar Tagen wieder gut.
-  Sollte sich die Zahnspange einmal verbiegen oder nicht mehr passen, versuche nicht, sie selbst zu reparieren, sondern rufe uns einfach an und vereinbare einen Termin.